

1. Indicare le azioni corrette per la preparazione del malato al cateterismo vescicale:

- A. letto in orizzontale – rimuovere la biancheria intima – malato supino e arti inferiori divaricati – igiene intima a inizio procedura
- B. letto in posizione Fowler – malato in posizione semiseduta – lavarsi le mani - bagno a letto alla fine della procedura
- C. letto in orizzontale – rimuovere la biancheria intima – malato in posizione semiseduta – igiene intima alla fine della procedura
- D. letto in posizione Fowler – lavarsi le mani – malato in posizione supina – bagno a letto alla fine della procedura

2. Indicare le azioni corrette per preparare il malato al clistere evacuativo:

- A. temperatura dell’acqua 37°-38° - malato in posizione laterale destra - - tela cerata sul letto – posizionarsi davanti al malato
- B. temperatura dell’acqua 42°-45° - padella sotto al bacino - malato in posizione supina – padella sotto al bacino
- C. temperatura dell’acqua 42°-45° - malato in posizione laterale destra – padella sotto al bacino - - posizionarsi dietro al malato
- D. temperatura dell’acqua 37°-38° - malato in posizione laterale sinistra – tela cerata sul letto – posizionarsi davanti al malato

3. Indicare le azioni corrette per riconoscere i segni precoci di danno da pressione:

- A. presenza di calore – presenza di cianosi - eritema irreversibile alla digitopressione – functio laesa
- B. presenza di calore - Arrossamento della cute – eritema irreversibile alla digitopressione - dolore
- C. presenza di calore - Cute pallida - eritema irreversibile alla digitopressione – edemi declivi
- D. eritema irreversibile alla digitopressione – functio laesa - Arrossamento della cute – edemi declivi

4. Indicare le azioni corrette per l’igiene del cavo orale al malato allettato:

- A. malato in decubito a 45° - utilizzare fisiologica e acido cloridrico – lavare i denti - pulire lingua e palato duro
- B. malato in decubito a 45° - utilizzare acqua – lavare i denti - pulire lingua e palato duro
- C. malato in decubito a 45° - utilizzare tampone imbevuto di acido cloridrico – pulire lingua e palato duro – igiene del viso
- D. malato in decubito a 45° - utilizzare fisiologica e acido cloridrico – lavare i denti – igiene del viso

5. Per posizionare dal letto alla carrozzina un malato emiplegico nella fase di riabilitazione, l’Operatore Socio Sanitario deve:

- A. sollevare il malato da solo e posizionarlo sulla carrozzina
- B. stimolare il malato a trasferirsi da solo sulla carrozzina affiancandola al letto
- C. far sedere il paziente sul bordo del letto per trasferirlo sulla carrozzina ai piedi del letto
- D. prendere in braccio il malato per posizionarlo sulla carrozzina ai piedi del letto

6. Quale è la corretta modalità di raccolta del campione di urine per urinocoltura

- A. pulizia dei genitali - lavaggio mani - contenitore sterile - urine del “getto” iniziale
- B. pulizia dei genitali - lavaggio mani - digiuno - contenitore pulito - urine del “getto” intermedio
- C. pulizia dei genitali, lavaggio mani, contenitore sterile, urine del “getto” intermedio
- D. pulizia dei genitali, lavaggio mani, contenitore pulito, urine del “getto” iniziale

7. Se si presenta un paziente con dispnea, in quale posizione si sistema

- A. disteso supino col capo sollevato
- B. nella posizione semi seduta
- C. disteso supino con i piedi sollevati
- D. disteso supino con le ginocchia flesse

PROVA 30MADDA
12/5/21

8. Durante l’attivit  di mobilizzazione, l’oss deve:

- A. Eseguire manovre decise anche se il malato lamenta dolore
- B. Coinvolgere il malato cercando di stimolare le funzioni residue
- C. Comunicare al malato la tipologia di esercizi da svolgere
- D. Sostituirsi al paziente

frnt
P. P. P.

9. Nell’uomo l’igiene dei genitali deve essere effettuato procedendo:

- A. Con movimenti circolari dall’esterno verso il meato urinario
- B. Con movimenti circolari dal meato urinario verso l’esterno
- C. Con movimenti circolari dal glande verso la base del pene
- D. Con movimenti circolari dalla base del pene verso il meato urinario

10. Nell’assistenza al malato con stipsi l’O.S.S. provvede a:

- A. Somministrare farmaci lassativi
- B. Preparare materiale per il clistere
- C. Elaborare una dieta equilibrata
- D. Eseguire clistere evacuativo

1. Indicare le azioni corrette per la preparazione del malato al cateterismo vescicale:

- A. letto in orizzontale – rimuovere la biancheria intima – malato supino e arti inferiori divaricati – igiene intima a inizio procedura
- B. letto in posizione Fowler –malato in posizione semiseduta – lavarsi le mani - bagno a letto alla fine della procedura
- C. letto in orizzontale – rimuovere la biancheria intima – malato in posizione semiseduta – igiene intima alla fine della procedura
- D. letto in posizione Fowler – lavarsi le mani – malato in posizione supina – bagno a letto alla fine della procedura

2. Indicare le azioni corrette per riconoscere i segni precoci di danno da pressione:

- A. presenza di calore – presenza di cianosi - eritema irreversibile alla digitopressione – functio laesa
- B. presenza di calore - Arrossamento della cute – eritema irreversibile alla digitopressione - dolore
- C. presenza di calore - Cute pallida - eritema irreversibile alla digitopressione – edemi declivi
- D. eritema irreversibile alla digitopressione – functio laesa - Arrossamento della cute – edemi declivi

3. - Per posizionare dal letto alla carrozzina un malato emiplegico nella fase di riabilitazione, l'Operatore Socio Sanitario deve:

- A. sollevare il malato da solo e posizionarlo sulla carrozzina
- B. stimolare il malato a trasferirsi da solo sulla carrozzina affiancandola al letto
- C. far sedere il paziente sul bordo del letto per trasferirlo sulla carrozzina ai piedi del letto
- D. prendere in braccio il malato per posizionarlo sulla carrozzina ai piedi del letto

4. - Se si presenta un paziente con dispnea, in quale posizione si sistema

- A. disteso supino col capo sollevato
- B. nella posizione semi seduta
- C. disteso supino con i piedi sollevati
- D. disteso supino con le ginocchia flesse

5. Nell'uomo l'igiene dei genitali deve essere effettuato procedendo:

- A. Con movimenti circolari dall'esterno verso il meato urinario
- B. Con movimenti circolari dal meato urinario verso l'esterno
- C. Con movimenti circolari dal glande verso la base del pene
- D. Con movimenti circolari dalla base del pene verso il meato urinario

6. - Indicare le azioni corrette per preparare il malato al clistere evacuativo:

- A. temperatura dell'acqua 37°-38° - malato in posizione laterale destra - - tela cerata sul letto – posizionarsi davanti al malato
- B. temperatura dell'acqua 42°-45° - padella sotto al bacino - malato in posizione supina – padella sotto al bacino
- C. temperatura dell'acqua 42°-45° - malato in posizione laterale destra – padella sotto al bacino - - posizionarsi dietro al malato
- D. temperatura dell'acqua 37°-38° - malato in posizione laterale sinistra – tela cerata sul letto – posizionarsi davanti al malato

7. - Quale è la corretta modalità di raccolta del campione di urine per urinocoltura

- A. pulizia dei genitali - lavaggio mani - contenitore sterile - urine del "getto" iniziale
- B. pulizia dei genitali - lavaggio mani - digiuno - contenitore pulito - urine del "getto" intermedio
- C. pulizia dei genitali, lavaggio mani, contenitore sterile, urine del "getto" intermedio
- D. pulizia dei genitali, lavaggio mani, contenitore pulito, urine del "getto" iniziale

8. Indicare le azioni corrette per l'igiene del cavo orale al malato allettato:

- A. malato in decubito a 45° - utilizzare fisiologica e acido cloridrico – lavare i denti - pulire lingua e palato duro
- B. malato in decubito a 45° - utilizzare acqua – lavare i denti - pulire lingua e palato duro
- C. malato in decubito a 45° - utilizzare tampone imbevuto di acido cloridrico – pulire lingua e palato duro – igiene del viso
- D. malato in decubito a 45° - utilizzare fisiologica e acido cloridrico – lavare i denti – igiene del viso

9. Nell'assistenza al malato con stipsi l'O.S.S. provvede a:

- A. Somministrare farmaci lassativi
- B. Preparare materiale per il clistere
- C. Elaborare una dieta equilibrata
- D. Eseguire clistere evacuativo

10. Durante l'attività di mobilizzazione, l'oss deve:

- A. Eseguire manovre decise anche se il malato lamenta dolore
- B. Coinvolgere il malato cercando di stimolare le funzioni residue
- C. Comunicare al malato la tipologia di esercizi da svolgere
- D. Sostituirsi al paziente

1. Indicare le azioni corrette per l'igiene del cavo orale al malato allettato:

- A. malato in decubito a 45° - utilizzare fisiologica e acido cloridrico – lavare i denti - pulire lingua e palato duro
- B. malato in decubito a 45° - utilizzare acqua – lavare i denti - pulire lingua e palato duro
- C. malato in decubito a 45° - utilizzare tampone imbevuto di acido cloridrico – pulire lingua e palato duro – igiene del viso
- D. malato in decubito a 45° - utilizzare fisiologica e acido cloridrico – lavare i denti – igiene del viso

2. Quale è la corretta modalità di raccolta del campione di urine per urinocoltura

- A. pulizia dei genitali - lavaggio mani - contenitore sterile - urine del "getto" iniziale
- B. pulizia dei genitali - lavaggio mani - digiuno - contenitore pulito - urine del "getto" intermedio
- C. pulizia dei genitali, lavaggio mani, contenitore sterile, urine del "getto" intermedio
- D. pulizia dei genitali, lavaggio mani, contenitore pulito, urine del "getto" iniziale

3. - Durante l'attività di mobilitazione, l'oss deve:

- A. Eseguire manovre decise anche se il malato lamenta dolore
- B. Coinvolgere il malato cercando di stimolare le funzioni residue
- C. Comunicare al malato la tipologia di esercizi da svolgere
- D. Sostituirsi al paziente

4. Nell'assistenza al malato con stipsi l'O.S.S. provvede a:

- A. Somministrare farmaci lassativi
- B. Preparare materiale per il clistere
- C. Elaborare una dieta equilibrata
- D. Eseguire clistere evacuativo

5. - Indicare le azioni corrette per preparare il malato al clistere evacuativo:

- A. temperatura dell'acqua 37°-38° - malato in posizione laterale destra - - tela cerata sul letto – posizionarsi davanti al malato
- B. temperatura dell'acqua 42°-45° - padella sotto al bacino - malato in posizione supina – padella sotto al bacino
- C. temperatura dell'acqua 42°-45° - malato in posizione laterale destra – padella sotto al bacino - - posizionarsi dietro al malato
- D. temperatura dell'acqua 37°-38° - malato in posizione laterale sinistra – tela cerata sul letto – posizionarsi davanti al malato

6. Per posizionare dal letto alla carrozzina un malato emiplegico nella fase di riabilitazione, l'Operatore Socio Sanitario deve:

- A. sollevare il malato da solo e posizionarlo sulla carrozzina
- B. stimolare il malato a trasferirsi da solo sulla carrozzina affiancandola al letto
- C. far sedere il paziente sul bordo del letto per trasferirlo sulla carrozzina ai piedi del letto
- D. prendere in braccio il malato per posizionarlo sulla carrozzina ai piedi del letto

7. Indicare le azioni corrette per la preparazione del malato al cateterismo vescicale:

- A. letto in orizzontale – rimuovere la biancheria intima – malato supino e arti inferiori divaricati – igiene intima a inizio procedura
- B. letto in posizione Fowler – malato in posizione semiseduta – lavarsi le mani - bagno a letto alla fine della procedura
- C. letto in orizzontale – rimuovere la biancheria intima – malato in posizione semiseduta – igiene intima alla fine della procedura
- D. letto in posizione Fowler – lavarsi le mani – malato in posizione supina – bagno a letto alla fine della procedura

8. Indicare le azioni corrette per riconoscere i segni precoci di danno da pressione:

- A. presenza di calore – presenza di cianosi - eritema irreversibile alla digitopressione – functio laesa
- B. presenza di calore - Arrossamento della cute – eritema irreversibile alla digitopressione - dolore
- C. presenza di calore - Cute pallida - eritema irreversibile alla digitopressione – edemi declivi
- D. eritema irreversibile alla digitopressione – functio laesa - Arrossamento della cute – edemi declivi

9. Nell'uomo l'igiene dei genitali deve essere effettuato procedendo:

- A. Con movimenti circolari dall'esterno verso il meato urinario
- B. Con movimenti circolari dal meato urinario verso l'esterno
- C. Con movimenti circolari dal glande verso la base del pene
- D. Con movimenti circolari dalla base del pene verso il meato urinario

10. Se si presenta un paziente con dispnea, in quale posizione si sistema

- A. disteso supino col capo sollevato
- B. nella posizione semi seduta
- C. disteso supino con i piedi sollevati
- D. disteso supino con le ginocchia flesse

-
1. **Se si presenta un paziente con dispnea, in quale posizione si sistema**
- disteso supino col capo sollevato
 - nella posizione semi seduta
 - disteso supino con i piedi sollevati
 - disteso supino con le ginocchia flesse
-
2. **Nell'uomo l'igiene dei genitali deve essere effettuato procedendo:**
- Con movimenti circolari dall'esterno verso il meato urinario
 - Con movimenti circolari dal meato urinario verso l'esterno
 - Con movimenti circolari dal glande verso la base del pene
 - Con movimenti circolari dalla base del pene verso il meato urinario
-
3. **Indicare le azioni corrette per la preparazione del malato al cateterismo vescicale:**
- letto in orizzontale – rimuovere la biancheria intima – malato supino e arti inferiori divaricati – igiene intima a inizio procedura
 - letto in posizione Fowler – malato in posizione semiseduta – lavarsi le mani - bagno a letto alla fine della procedura
 - letto in orizzontale – rimuovere la biancheria intima – malato in posizione semiseduta – igiene intima alla fine della procedura
 - letto in posizione Fowler – lavarsi le mani – malato in posizione supina – bagno a letto alla fine della procedura
-
4. **Indicare le azioni corrette per riconoscere i segni precoci di danno da pressione:**
- presenza di calore – presenza di cianosi - eritema irreversibile alla digitopressione – functio laesa
 - presenza di calore - Arrossamento della cute – eritema irreversibile alla digitopressione - dolore
 - presenza di calore - Cute pallida - eritema irreversibile alla digitopressione – edemi declivi
 - eritema irreversibile alla digitopressione – functio laesa - Arrossamento della cute – edemi declivi
-
5. **Per posizionare dal letto alla carrozzina un malato emiplegico nella fase di riabilitazione, l'Operatore Socio Sanitario deve:**
- sollevare il malato da solo e posizionarlo sulla carrozzina
 - stimolare il malato a trasferirsi da solo sulla carrozzina affiancandola al letto
 - far sedere il paziente sul bordo del letto per trasferirlo sulla carrozzina ai piedi del letto
 - prendere in braccio il malato per posizionarlo sulla carrozzina ai piedi del letto
-
6. **Indicare le azioni corrette per preparare il malato al clistere evacuativo:**
- temperatura dell'acqua 37°-38° - malato in posizione laterale destra - - tela cerata sul letto – posizionarsi davanti al malato
 - temperatura dell'acqua 42°-45° - padella sotto al bacino - malato in posizione supina – padella sotto al bacino
 - temperatura dell'acqua 42°-45° - malato in posizione laterale destra – padella sotto al bacino - - posizionarsi dietro al malato
 - temperatura dell'acqua 37°-38° - malato in posizione laterale sinistra – tela cerata sul letto – posizionarsi davanti al malato
-
7. **Indicare le azioni corrette per l'igiene del cavo orale al malato allettato:**
- malato in decubito a 45° - utilizzare fisiologica e acido cloridrico – lavare i denti - pulire lingua e palato duro
 - malato in decubito a 45° - utilizzare acqua – lavare i denti - pulire lingua e palato duro
 - malato in decubito a 45° - utilizzare tampone imbevuto di acido cloridrico – pulire lingua e palato duro – igiene del viso
 - malato in decubito a 45° - utilizzare fisiologica e acido cloridrico – lavare i denti – igiene del viso
-
8. **Quale è la corretta modalità di raccolta del campione di urine per urinocoltura**
- pulizia dei genitali - lavaggio mani - contenitore sterile - urine del "getto" iniziale
 - pulizia dei genitali - lavaggio mani - digiuno - contenitore pulito - urine del "getto" intermedio
 - pulizia dei genitali, lavaggio mani, contenitore sterile, urine del "getto" intermedio
 - pulizia dei genitali, lavaggio mani, contenitore pulito, urine del "getto" iniziale
-
9. **Durante l'attività di mobilitazione, l'oss deve:**
- Eeguire manovre decise anche se il malato lamenta dolore
 - Coinvolgere il malato cercando di stimolare le funzioni residue
 - Comunicare al malato la tipologia di esercizi da svolgere
 - Sostituirsi al paziente
-
10. **Nell'assistenza al malato con stipsi l'O.S.S. provvede a:**
- Somministrare farmaci lassativi
 - Preparare materiale per il clistere
 - Elaborare una dieta equilibrata
 - Eeguire clistere evacuativo

1. Nell'assistenza al malato con stipsi l'O.S.S. provvede a:

- A. Somministrare farmaci lassativi
- B. Preparare materiale per il clistere
- C. Elaborare una dieta equilibrata
- D. Eseguire clistere evacuativo

2. Indicare le azioni corrette per preparare il malato al clistere evacuativo:

- A. temperatura dell'acqua 37°-38° - malato in posizione laterale destra - - tela cerata sul letto – posizionarsi davanti al malato
- B. temperatura dell'acqua 42°-45° - padella sotto al bacino - malato in posizione supina – padella sotto al bacino
- C. temperatura dell'acqua 42°-45° - malato in posizione laterale destra – padella sotto al bacino - - posizionarsi dietro al malato
- D. temperatura dell'acqua 37°-38° - malato in posizione laterale sinistra – tela cerata sul letto – posizionarsi davanti al malato

3. Indicare le azioni corrette per l'igiene del cavo orale al malato allettato:

- A. malato in decubito a 45° - utilizzare fisiologica e acido cloridrico – lavare i denti - pulire lingua e palato duro
- B. malato in decubito a 45° - utilizzare acqua – lavare i denti - pulire lingua e palato duro
- C. malato in decubito a 45° - utilizzare tampone imbevuto di acido cloridrico – pulire lingua e palato duro – igiene del viso
- D. malato in decubito a 45° - utilizzare fisiologica e acido cloridrico – lavare i denti – igiene del viso

4. Quale è la corretta modalità di raccolta del campione di urine per urinocoltura

- A. pulizia dei genitali - lavaggio mani - contenitore sterile - urine del "getto" iniziale
- B. pulizia dei genitali - lavaggio mani - digiuno - contenitore pulito - urine del "getto" intermedio
- C. pulizia dei genitali, lavaggio mani, contenitore sterile, urine del "getto" intermedio
- D. pulizia dei genitali, lavaggio mani, contenitore pulito, urine del "getto" iniziale

5. Durante l'attività di mobilitazione, l'oss deve:

- A. Eseguire manovre decise anche se il malato lamenta dolore
- B. Coinvolgere il malato cercando di stimolare le funzioni residue
- C. Comunicare al malato la tipologia di esercizi da svolgere
- D. Sostituirsi al paziente

6. Indicare le azioni corrette per la preparazione del malato al cateterismo vescicale:

- A. letto in orizzontale – rimuovere la biancheria intima – malato supino e arti inferiori divaricati – igiene intima a inizio procedura
- B. letto in posizione Fowler –malato in posizione semiseduta – lavarsi le mani - bagno a letto alla fine della procedura
- C. letto in orizzontale – rimuovere la biancheria intima – malato in posizione semiseduta – igiene intima alla fine della procedura
- D. letto in posizione Fowler – lavarsi le mani – malato in posizione supina – bagno a letto alla fine della procedura

7. Indicare le azioni corrette per riconoscere i segni precoci di danno da pressione:

- A. presenza di calore – presenza di cianosi - eritema irreversibile alla digitopressione – functio laesa
- B. presenza di calore - Arrossamento della cute – eritema irreversibile alla digitopressione - dolore
- C. presenza di calore - Cute pallida - eritema irreversibile alla digitopressione – edemi declivi
- D. eritema irreversibile alla digitopressione – functio laesa - Arrossamento della cute – edemi declivi

8. - Per posizionare dal letto alla carrozzina un malato emiplegico nella fase di riabilitazione, l'Operatore Socio Sanitario deve:

- A. sollevare il malato da solo e posizionarlo sulla carrozzina
- B. stimolare il malato a trasferirsi da solo sulla carrozzina affiancandola al letto
- C. far sedere il paziente sul bordo del letto per trasferirlo sulla carrozzina ai piedi del letto
- D. prendere in braccio il malato per posizionarlo sulla carrozzina ai piedi del letto

9. - Se si presenta un paziente con dispnea, in quale posizione si sistema

- A. disteso supino col capo sollevato
- B. nella posizione semi seduta
- C. disteso supino con i piedi sollevati
- D. disteso supino con le ginocchia flesse

10. Nell'uomo l'igiene dei genitali deve essere effettuato procedendo:

- A. Con movimenti circolari dall'esterno verso il meato urinario
- B. Con movimenti circolari dal meato urinario verso l'esterno
- C. Con movimenti circolari dal glande verso la base del pene
- D. Con movimenti circolari dalla base del pene verso il meato urinario